

55, rue Mazenod - 69426 LYON CÉDEX 03 - ☎ 78.95.48.48

22 Mai 1987

N° de série continue 147

Bulletin n° 13

VIGNE : LE CONCOURS MILDIOU EST OUVERT : RECHERCHEZ LES FOYERS PRIMAIRES

VIGNE

Black-rot : Protégez les foyers habituels
Oïdium : Soignez la protection des cépages sensibles
Tordeuse de la grappe : il est encore trop tôt pour traiter
Mildiou : Le concours de détection des taches primaires est ouvert

BLACK-ROT - Soignez la protection préventive contre la maladie

OIDIUM - Sur cépage sensible, 2 traitements avant floraison. Pensez-y

Des symptômes en drapeaux se sont développés. L'hygrométrie élevée de la dernière période a favorisé la maladie.

TORDEUSE DE LA GRAPPE - En lère génération, la protection vise les glomérules

Le 1er vol est en cours, fortement diminué par la fraîcheur. Quelques pontes ont été déposées, mais il est encore trop tôt pour traiter.

MILDIOU - lères contaminations probables, suite aux pluies des 18-20

Situation : une série de pluies (18-20 Mai), mais avec des températures fraîches. La quantité d'eau a partout suffi pour permettre au Mildiou de se développer, mais la maladie est défavorisée par les températures. Les lères taches issues de ces contaminations pourraient paraître à la fin du mois dans les situations les plus favorables au Mildiou :

- bas fonds humides : mouillères
 - parcelles ayant subi des attaques en 1986 avec un mildiou-mosaïque à l'automne
- Aucun traitement n'est à prévoir : des informations dans un prochain Bulletin.

CONCOURS MILDIOU : SOYEZ NOMBREUX A RECHERCHER LES FOYERS

Les personnes qui nous signaleront les TROIS PREMIERS FOYERS de communes différentes bénéficieront d'un abonnement gratuit de 1 an à la revue PHYTOMA - défense des cultures. LA CONNAISSANCE DES FOYERS PRIMAIRES PERMET D'AJUSTER LES CONSEILS DE LUTTE

En cas de découverte de taches :

- téléphonez à la Protection des Végétaux Poste de Privas (75.64.64.22)
- enveloppez les feuilles tachées entre 2 feuilles de papier journal) important pour
ou dans du coton hydrophylle et glissez le tout dans un sac plastique) la conservation
- envoyez ce sac dans un colis affranchi à :
D.D.A.F. - 3e Service PROTECTION DES VÉGÉTAUX
7 bld du Lycée - B.P. 719
07007 PRIVAS CEDEX

..... coupon à détacher et à retourner complété avec votre échantillon

Nom, prénom	Age de la vigne
Adresse	Cépage
.....	Rang de la feuille sur le rameau en partant
.....	de la base (1er, 2e, etc.)
.....	Situation du vignoble (côteau, plaine,
.....	cuvette, etc.)
Date	Importance de l'attaque

P 280

ARBRES FRUITIERS

CONTRE LES PSYLLES, PUCERONS, ACARIENS... DES AUXILIAIRES PEUVENT VOUS AIDER : NE LES DETRUISEZ PAS.

PECHER : Tordeuse Orientale - Traitement des jeunes plantations

Pucerons verts (Myzus) - Ne détruisez pas ses prédateurs

Cloque - Des symptômes parfois nombreux

Oïdium - Toujours période sensible

POIRIER - POMMIER : Tavelures - Maintenez une protection préventive soignée

Carpocapse - 1ères captures en situation précoce et moyenne

POIRIER : Psylles - Surveillez les larves de 2ème génération

Carpocapse - Utilisez un produit peu dangereux sur les auxiliaires

PECHER

TORDEUSE ORIENTALE - Pour la protection des pousses, intervenez dès réception

Après une lère période d'activité des adultes, le temps frais a retardé l'évolution du ravageur.

- pour la protection des pousses (pépinières et jeunes plantations lère feuille)

Intervenez dès réception avec fénitrothion à 50 g ma/hl (nb spéc) ou phosalone à 60 g ma/hl (AZOPHENE, ZOLONE)

En présence de pucerons, préférez fluvalinate (KLARTAN à 0,09 l/hl) ou méthomyl à 75 g ma/hl (LANNATE, METOVER).

- pour la protection des fruits, il est encore trop tôt pour intervenir

Il s'agit de diminuer la population de lère génération, pour que la suite de la lutte soit plus aisée. Attendez un prochain Bulletin.

PUCERON VERT (MYZUS) - Evitez tout insecticide polyvalent



larve de syrphe
(Epistrophe
balteata)



larve de
coccinelle

Surveillez les colonies. Actuellement, elles hébergent des prédateurs parfois nombreux (larves de syrphes, de chrysopes, coccinelles, etc...).

Si une intervention est nécessaire, ne détruisez pas les prédateurs.

CLOQUE - Aucun traitement de rattrapage n'est efficace

Les symptômes apparus depuis quelques semaines sont probablement dûs à une mauvaise couverture de la période de débourrement des yeux à bois latéraux. Il est inutile de traiter les vergers atteints. Seul le rétablissement d'un temps chaud et sec arrêtera l'évolution de la maladie.

OÏDIUM - Sensibilité maximale jusqu'au durcissement du noyau

Diminuez les doses de soufre en cas de chaleur, mais resserez les cadences en verger sensible.

Sur attaque déclarée, préférez un fongicide de synthèse pénétrant.

TAVELURES - En verger sensible, poursuivez la protection en fonction des conditions climatiques.